

Stratégie de dépistage du Cancer colorectal*

Personne âgée de 50 à 74 ans

Risque très élevé de CCR		Risque élevé de CCR				Risque Moyen de CCR			
Antécédent familial au 1 ^{er} degré (père, mère, frère, sœur, ou enfant)		Antécédent personnel							
Polypose Adénomateuse Familiale	Syndrome de Lynch (HNPCC)	Cancer Colorectal	Adénome >1cm	Cancer colorectal	Adénome	MICI	Signes digestifs récents	Coloscopie normale de moins de 5 ans sans antécédent	Maladie intercurrente
	3 parents 1 ^{er} degré atteints de cancer +2 générations successives + un cancer avant 50 ans	Chez un parent au 1 ^{er} degré < 65 ans Chez 2 parents au 1 ^{er} degré	Chez un parent au 1 ^{er} degré < 65ans		>=1cm ou Villeux ou Dysplasie de haut grade ou nombre >=3	RCH ou Crohn étendues	Douleur et troubles du transit Rectorragies		Insuffisance cardiaque terminale, cancer évolutif... AVC récents, infarctus du myocarde...
RR=100%	RR=80-90%	RR x 3-5	RR x 2						
Recto-sigmoïdoscopie	Coloscopie	Coloscopie		Coloscopie		Coloscopie	Bilan diagnostique approprié	Test de recherche de sang dans les selles 5 ans après la coloscopie	Selon le cas exclusion définitive ou temporaire et test de recherche reporté à 2 ans
- Tous les ans - A partir de 10-12 ans	- Tous les deux ans - A partir de 20 à 25 ans	- A partir de 45 ans - ou moins 5 ans avant l'âge du cas index		A 3 ans		Tous les 2-3 ans après 10 à 15ans d'évolution			

RISQUE MOYEN SANS ANTECEDENT : Test de Recherche de Sang dans les Selles